

# GIBB A3

## NÖVEKEDÉSSERKENTŐ GIBBERRELÍNSAV

Forgalmazási engedély száma: 621/29.04.2014

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

<http://www.ga3.hu> / [office@ga3.hu](mailto:office@ga3.hu)

A Gibb A3 növekedésserkentő gibberellinsav tablettát vízben oldva, kell elkészíteni az egy hektár permetezéséhez szükséges, az alábbi növények kezelésének megfelelő koncentrátumú oldatot.

### PARADICSOM ÉS SZŐLŐ. *A termést hektáronként 16-20%-al növeli*

Adagolás/ha: 3 tablettát 200 L vízben oldva. Alkalmazás: 3 levélkezelést kell alkalmazni

#### *a paradicsom esetében:*

- I. fázis, ültetés után, virágzás előtt,
- II. fázis, virágzás kezdetén,
- III. fázis, virágzás után,

#### *a szőlő esetében:*

- I fázis, virágzás előtt;
- II fázis, virágzás után;
- III fázis, gerezdek megjelenésekor.

### BURGONYA. *A termést hektáronként >30%-al növeli*

Adagolás/ha: 10 tablettát 200 L vízben oldva: Alkalmazás: 3 levélkezelést kell alkalmazni,

- I. fázis, kikelés után 10-15 nappal;
- II. fázis, virágzás előtt, vagy az első kezelés után 2-3 hétre;
- III. fázis, gumóképződés idején.

### BÚZA. *A termést hektáronként 5-8%-al növeli*

Adagolás/ha: 3 tablettát 200 L vízben oldva. Alkalmazás: 2 levélkezelést kell alkalmazni,

- I. fázis, a szár kialakulásának kezdetén
- II. fázis, 2-3 héttel az első kezelés után

### ÁRPA és RIZS. *A termést hektáronként 15-20%-al növeli*

Adagolás/ha: 3 tablettát 200 L vízben oldva. Alkalmazás: 2 levélkezelést kell alkalmazni:

- I. fázis, a szalma kialakulásának kezdetén
- II. fázis, 2-3 héttel az első kezelés után

### NAPRAFORGÓ. *A termést hektáronként 15-20%-al növeli*

Adagolás/ha: 3 tablettát 200 L vízben oldva. Alkalmazás: 2 levélkezelést kell alkalmazni,

- I. fázis, amikor a 3-4. levél alakul ki;
- II. fázis, amikor a 10-12. levél alakul ki.

### LUCERNA. *A szárazanyagtermést hektáronként 15-40%-al növeli*

Adagolás/ha: 10 tablettát 200 L vízben oldva. Alkalmazás: egyszeri levélkezelés szükséges, a lucerna növekedésének akármelyik fázisában alkalmazni lehet.

### ÉDES CSERESZNYE, MEGGY. *A gyümölcs állaga ropogósabb lesz, szebb, több időt bír polcon, késlelteti a foltok megjelenését.*

Adagolás/ha: 10 tablettát 1000 L vízben oldva. Alkalmazás, levélkezelés 2 héttel a szüretelés előtt.

### FÖLDIEPER. *Növeli a gyümölcsök számát, méretét és minőségét.*

Adagolás/ha: 14 tablettát 200 L vízben oldva. Alkalmazás: három levélkezelésre van szükség

- I. fázis, virágzás előtt 20 nappal,
- II. fázis, virágzás után,
- III. fázis, 15 nap a második kezelés után.

### CSÍPŐSPAPRIKA / CSEMEGEPAPRIKA. *Növekszik a gyümölcsök száma, mérete és minősége, ideértve a szárazanyagot is.*

Alkalmazás/ha: 10 tablettát 200 L vízben oldva. Alkalmazás: egyszeri alkalommal, virágzás alatt;

### FŐZŐTÖK / SALÁTA / SPENÓT. *Stimulálja a növekedést és növeli a fagyállóságot.*

Adagolás/ha: 9 tablettát 300 L vízben oldva. Alkalmazás:

egyszeri alkalommal, szüretelés előtt 4-5 héttel.

#### ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS

Az oldatot, az elkészítésétől számított 24 órán belül, lehetőleg hűvös időben, reggel vagy este, szét kell szórni. A levélkezelést olyan időben kell elvégezni, amikor a következő 4 órában eső nem valószínűsíthető. Ha a permetezés után mégis esik, a kezelést meg kell ismételni az ajánlott dózis felével.

**Az alkalmazás során szigorúan be kell tartani a Biztonsági adatlap utasításait!**